INTRODUÇÃO

Os pólipos serrados são de difícil deteção e existem alguns estudos que sugerem haver uma associação com os adenomas.

Objetivo: avaliar o comportamento dos pólipos serrados, seus fatores preditores e, eventual, associação com adenomas.

MATERIAL/MÉTODOS

Estudo retrospectivo com análise de colonoscopias totais seriadas, e com pelo menos um pólipo, entre 2018 e 2019
Colhidos dados demográficos, do relatório da colonoscopia e histologia
Excluídos doentes com DII e com mais de 10 pólipos

RESULTADOS

479 colonoscopias totais
1228 pólipos (497 serrados, 671 adenomas, outros 60)
Idade média 65,47 ± 11,12 anos, 66,8% sexo masculino

Figura 1: Caracterização dos pólipos serrados (n=497)

Figura 2: Localização pólipos serrados

Observou-se uma correlação negativa entre o número de pólipos serrados e adenomas ($r = -0,113$; $p = 0,014$)

Tabela 1: Fatores preditores de pólipos serrados

	Pólipos serrados (n=497) (B)	P value	OR
Género (feminino)	0,662	0,026	1,938
idade	- 0,016	0,006	0,981
Nº adenomas	- 0,378	<0,001	0,686

Tabela 2: Avaliação da associação de pólipos serrados e adenomas

Nº adenomas	Não hiperplásicos	P value	OR
	29,8%	0,008	0,4 [IC 0,199-0,801]
	Microvesiculares		
	60,6%	0,008	2,17 [IC 1,22-3,87]

CONCLUSÕES

Parece existir uma associação entre adenomas e pólipos microvesiculares, sugerindo um comportamento diferente destes. Nos doentes com pólipos microvesiculares, e sem deteção de adenomas, seria de ponderar antecipar a vigilância de polipectomia.