

79 METÁSTASE GÁSTRICA DE SARCOMA SINOVIAL DO PULMÃO

Costa Santos M., Palmela C., Gouveia C., Barjas E., Ferreira R., Santos M., Garrido R., Luz G., Oliveira H., Cravo M.

Descreve-se o caso de um doente do sexo masculino, 63 anos, com antecedentes de sarcoma sinovial do pulmão, submetido a pneumectomia três anos antes. Admitido no Serviço de Urgência por melenas e astenia com cerca de um mês de evolução. À observação encontrava-se hemodinamicamente estável, com pele e mucosas descoradas, abdómen mole, depressível e indolor à palpação e toque retal com melenas. Analiticamente apresentava anemia normocítica normocrómica (Hb 6,1g/dL, VGM 85fL, HGM 27pg), sem outras alterações de relevo. Após estabilização hemodinâmica realizou endoscopia digestiva alta que mostrou presença de sangue vermelho-vivo e digerido no lúmen gástrico e na face anterior da grande curvatura lesão vegetante pseudopolipóide, de consistência mole, friável ao toque, com cerca de 5 cm. As biópsias revelaram neoplasia maligna fusocelular com expressão de Bcl-2 e vimentina e positividade focal para CD99, AE1/AE3 e EMA, achados compatíveis com sarcoma sinovial. A tomografia computadorizada toraco-abdomino-pélvica não mostrou sinais de invasão ganglionar ou metastização à distância. Após discussão em reunião de grupo multidisciplinar, o doente foi submetido a ressecção gástrica. O estudo histológico da peça revelou sarcoma sinovial com invasão da camada muscular da parede gástrica, com margens de ressecção livres. O pós-operatório decorreu sem intercorrências e o doente teve alta ao 25º dia de internamento. Mantém atualmente seguimento na consulta de Cirurgia Geral.

O sarcoma sinovial é um tumor de tecidos moles que geralmente ocorre nos membros. O sarcoma sinovial primário do estômago é extremamente raro, com 14 casos descritos na literatura, não se tendo encontrado registos de metástase gástrica de sarcoma sinovial do pulmão.

Hospital Beatriz Ângelo, Loures