282 INFECÇÃO POR *HELICOBACTER PYLORI* NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES OBESOS PROPOSTOS PARA CIRURGIA BARIÁTRICA

Vaz AM.1, Eusébio M.1, Antunes A.1, Gago T.1, Queirós P.1, Sanchez M.2, Sanai T.2, Teixeira J.2, Ornelas R.1, Guerreiro H.1

Introdução: A prevalência da infecção por *Helicobacter Pylori* (H.P.) na população Portuguesa ronda os 80%. O seu potencial ulcerogénico e carcinogénico tornou prática comum o seu rastreio e erradicação previamente à cirurgia bariátrica. Recentemente, a relação entre este patógeno e vários distúrbios metabólicos tem sido alvo de atenção.

Objectivo: Avaliar a prevalência de *Helicobacter pylori* e sua relação com outras comorbilidades metabólicas em obesos.

Material/métodos: Estudo retrospectivo de doentes submetidos a cirurgia bariátrica com endoscopia digestiva alta prévia entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2014.

Resultados: Incluídos 200 doentes, 90% mulheres, idade média de $44,2 \pm 11,2$ anos, peso médio de $109,6 \pm 18,2$ Kg e IMC médio de $42,2 \pm 4,9$ Kg/m². Verificou-se presença de HTA em 58%, Hipercolesterolemia em 57,5%; Hipertrigliceridemia em 23,5%; Diabetes mellitus tipo2 em 28%. A prevalência de H.P nesta população foi de 58%, com diagnóstico por biópsia gástrica transendoscópica (histologia ou teste da urease) em 109 doentes (94%) e nos restantes por pesquisa de antigénio fecal. Não se verificou uma relação significativa entre a presença de queixas dispépticas, achados endoscópicos ou histológicos, peso, IMC ou idade e a positividade para o H.P. Relativamente às comorbilidades metabólicas anteriormente descritas, destaca-se uma relação estatisticamente significativa entre a presença de alterações nos valores de colesterol e a positividade para o *H.Pylori* ($p < 0,05$). A terapêutica tripla (amoxicilina+claritromicina+pantoprazol) teve uma taxa de resposta mínima de 75%; 9 doentes (7,8%) necessitaram de terapêutica sequencial. Ocorreram complicações pós-operatórias em 12 doentes (6%), sem relação significativa com a positividade para H.P.

Conclusões: Verificou-se uma menor prevalência de H.P em indivíduos obesos relativamente à população geral, bem como uma relação significativa entre hipercolesterolemia e infecção por H.P, possivelmente explicadas por alterações na secreção de grelina e do perfil das apolipoproteínas condicionados por esta infecção. A erradicação do *Helicobacter Pylori* pode pois melhorar o perfil lipídico nesta população.

1 Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar do Algarve 2 Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, Centro Hospitalar do Algarve