

GRAVIDEZ NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO

Ana L. Santos. Susana Lopes. Patrícia Andrade. Guilherme Macedo
Serviço de Gastreenterologia, Centro Hospitalar Universitário de São João

INTRODUÇÃO

- ❖ A atividade da DII no momento da concepção é determinante do seu curso durante a gravidez.
- ❖ Com este trabalho, pretendeu-se determinar os preditores associados a agudização de DII durante a gravidez e no período pós-parto(PPP) bem como analisar o impacto da DII e suas terapêuticas no recém-nascido(RN).



MATERIAL/MÉTODOS

- ❖ Estudo retrospectivo e observacional, com inclusão de grávidas com DII seguidas em consulta externa de um centro terciário, entre Janeiro.2010 e Abril.2020.
- ❖ Analisaram-se o curso da doença durante a gravidez bem como os fatores preditores de exacerbação e complicações relacionadas com a gravidez/RN.

RESULTADOS

- ❖ N=110
- ❖ Idade média: 30±5 anos
- ❖ 64% doença de Crohn | 36% colite ulcerosa

- ❖ 6 casos de agudização com necessidade de corticoterapia no trimestre prévio à gravidez



5 no 3º trimestre
Necessidade de hospitalização:
3 (CU vs DC 83 vs 36%, p=0.031)

Período pós-parto

Agudização: 16%, superior:

- Grupo sem terapêutica ou apenas com messalazina pré-concepção (23 vs 7%, p=0.024)
- Agudização durante a gravidez (55 vs 12%, p=0.002)

❖ Análise multivariada – Fatores preditores de agudização

- Ausência de terapêutica/terapêutica isolada com messalazina pré-concepção (OR=4.084;1.065-15.662)
- Ocorrência de agudização da doença durante a gravidez (OR=6.836;1.724-27.110)

Complicações com RN: 10% dos casos [9%prematuridade, 9%baixo peso à nascença(BPN)].

- A incidência de BPN foi superior nos RN cujas mães apresentam exacerbação com hospitalização durante a gravidez (66.7v12.12%,p=0.048)

CONCLUSÕES

- ❖ A exacerbação da DII e as complicações na gravidez são mais frequentes nas doentes com terapêutica de manutenção menos intensiva ou necessidade de CO no período pré-concepcional.
- ❖ A agudização da DII com necessidade de hospitalização associou-se a maior incidência de BPN. A remissão da DII é essencial para diminuir as complicações na gravidez.