

206 PÓLIPO DE PROLAPSO MUCOSO MIMETIZANDO LESÃO NEOPLÁSICA

Libânio D., Lage J., Pimentel-Nunes P., Dinis-Ribeiro M.

Introdução

Os pólipos de prolapso da mucosa retal são lesões inflamatórias raras enquadradas no espectro do síndrome de prolapso mucoso (que inclui também os pólipos inflamatórios cloacogénicos e os pólipos inflamatórios *cap*). Apresentamos o caso de um doente referenciado por suspeita de neoplasia do reto.

Descrição do caso / achados endoscópicos

Homem de 44 anos, com antecedentes de obstipação, referenciado à nossa consulta por retorragias e lesão neoplásica do reto. Ao toque retal apresentava lesão móvel pediculada, sem anemia ou outras alterações analíticas. A avaliação endoscópica mostrou lesão aos 7cm da margem anal, com 25mm de diâmetro, plíavel e de consistência mole, de aparência subepitelial mas com mucosa envolvente eritematosa, irregular e com áreas de erosão. A ecoendoscopia mostrou uma lesão bem delimitada, hipoecóica, com origem na muscular da mucosa. As biopsias *bite-on-bite* mostraram dilatação e desarranjo de criptas, tecido de granulação, infiltrado inflamatório na lâmina própria e fibrose. Decidida ressecção endoscópica, não efetuada por elevação incompleta pelo que se optou por exérese parcial para diagnóstico definitivo, o que permitiu observar extensa fibrose da base da lesão. O exame histopatológico mostrou alterações compatíveis com prolapso da mucosa retal. Após tratamento da obstipação e evicção de esforço defecatório observada melhoria clínica com cessação das retorragias.

Conclusões

Os pólipos de prolapso da mucosa retal são entidades raras, especialmente se não associadas a prolapso retal. O seu mecanismo etiopatogénico provável é a isquemia associada a traumatismo repetido pelo esforço defecatório. A raridade do caso e a sua iconografia alertam para a necessidade de considerar estas lesões no diagnóstico diferencial de lesões polipóides ano-retais.

Serviço de Gastrenterologia, Instituto Português de Oncologia do Porto