

EP-088 - EFICÁCIA E SEGURANÇA DO CIANOACRILATO NO TRATAMENTO DA HEMORRAGIA AGUDA POR VARIZES GÁSTRICAS – ESTUDO RETROSPECTIVO DE 8 ANOS

Guilherme Simões¹; Manuel Rocha¹; Verónica Borges¹; Verónica Gamelas¹; Sara Santos¹; Rita Saraiva¹; Maria João Bettencourt¹

1 - Serviço de Gastroenterologia do Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central

INTRODUÇÃO

A hemorragia digestiva por varizes gástricas é uma emergência médica associada a alta mortalidade. Apesar de menos frequente do que a hemorragia por varizes esofágicas, a hemorragia por varizes gástricas é mais grave e o seu tratamento revela-se um verdadeiro desafio.

A melhor opção terapêutica para a hemorragia por varizes gástricas continuar mal definida, contudo a obliteração das varizes com cola biológica, como o cianoacrilato, tem sido recomendada como terapêutica de primeira linha. Pretende-se avaliar a eficácia e segurança do tratamento com cianoacrilato.

MÉTODOS

Análise retrospectiva dos doentes submetidos a terapêutica com N-butil-2-cianoacrilato por hemorragia digestiva de varizes gástricas, entre 1/01/2011 até 31/12/2018 num Centro Hospitalar Terciário.

RESULTADOS

Durante 8 anos foram tratados com cianoacrilato 22 doentes, 16 homens, média de idades de 57(±10.6) anos, 27%(6/22) com trombose espleno-portal e 91%(20/22) com hipertensão portal por cirrose, com Child-Pugh médio de 7.7(±1.1) e MELD-Na médio de 12.8(±3.5). Em 55%(12/22) dos doentes a cirrose estava relacionada com o álcool, dos quais 50% mantinha hábitos alcoólicos. Havia história de hemorragia varicosa no passado em 64%(14/22) dos doentes: destes, 71% já realizado laqueação elástica de varizes esofágicas. Em 95%(21/22) dos casos observou-se varizes grandes e a sua localização, de acordo com a classificação de Sarin, foi IGV1 em 50% dos casos. Observou-se hemorragia ativa de baixo débito em 8.6% dos casos, e todos os restantes apresentavam estigmas de hemorragia recente. A média de volume injetado foi de 2.5mL. Houve hemostase inicial em 90%(19/21) dos doentes e recidiva hemorrágica em 5%(1/19), que foi resolvida com aplicação de cianoacrilato. Não se observaram complicações associadas ao procedimento.

Apenas um doente faleceu durante o internamento por complicações não relacionadas com hemorragia digestiva.

CONCLUSÕES

A obliteração de varizes com cianoacrilato é uma intervenção segura e eficaz no tratamento da hemorragia por varizes gástricas, constituindo uma opção terapêutica útil.