

245 A PANCREATITE AGUDA PÓS CPRE NA ERA DA INDOMETACINA

Perdigoto D., Alves A., Guerreiro C., Gomes D., Camacho E., Almeida N., Sofia M., Mesquita R., Portela F., Sofia C.

Introdução: a pancreatite aguda iatrogénica após colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é uma complicação frequente podendo ocorrer em 10-

15% dos doentes que apresentem múltiplos factores de risco. A administração de indometacina tem sido apontada como a única atitude que pode reduzir a sua incidência nestes doentes. O objetivo deste trabalho foi determinar a taxa de pancreatite pós CPRE (PPC) e a sua evolução em doentes submetidos a profilaxia com indometacina, num centro de referência. Métodos: estudo retrospectivo de CPREs com a administração profilática de indometacina (100mg retal) no final do exame, no período de Julho 2012 a Fevereiro 2014. A PPC leve definiu-

se como a elevação de amilase superior a 3x o normal com dor abdominal e internamento inferior a três dias, a moderada quando o internamento atingia 4-

10 dias e a grave com tempo superior a 10 dias, com complicações ou necessidade de cuidados intensivos. Os fatores de risco foram definidos como associados ao doente (idade, sexo, história de PPC, bilirrubina, calibre do colédoco) e ao procedimento (múltiplas tentativas de cateterização, injeção de contraste no Wirsung, pré-corte, dilatação pneumática). Resultados: identificaram-

se 181 doentes, 107 mulheres (57%); a idade média foi de 64 anos $\pm$ 17. PPC ocorreu em 26 casos (13.8%), foi leve em 3 (11%), moderada em 15 (58%) e grave em 8 (31%) tendo ocorrido um óbito imputado à técnica. A opacificação do Wirsung com contraste associou-se a maior probabilidade de PPC ($p=0.003$). Não houve correlação entre outros fatores e o risco de PPC. O número total de fatores também não influenciou a taxa de PPC.

Conclusões: Apesar da profilaxia com indometacina a PPC ainda é uma complicação frequente e potencialmente grave em doentes com risco elevado. A injeção de contraste no Wirsung demonstrou aumentar o risco de PPC pelo que deve ser evitada.

Serviço de Gastroenterologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra