

29 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE CAUSA INESPERADA

Meireles L., Carvalho J. R., Lopes J., Carrilho-Ribeiro L., Velosa J.

Mulher de 67 anos, com antecedentes de gonartrose direita com toma frequente de anti-inflamatórios não esteróides. Inicia quadro de artralguas generalizadas, odinofagia, febre e lesões petequiais nos membros inferiores e superiores. É feito o diagnóstico de amgdalite exsudativa e medicada com penicilina benzatínica e anti-histaminico, corticosteroides tópicos, para as lesões cutâneas. Verificou-se melhoria do quadro de amigdalite mas, apesar da terapêutica instituída, ocorreu progressão das lesões cutâneas com envolvimento do tronco. Quinze dias depois, inicia quadro de dor abdominal associada a hematemese, sem repercussão hemodinâmica. Realizou endoscopia digestiva alta que revelou mucosa edemaciada com múltiplas sufusões hemorrágicas e muco, desde o bulbo duodenal até ao limite da progressão do endoscópico.

Dado o contexto clínico foi considerada a hipótese de vasculite. Do estudo etiológico resultou: ANA e ANCA negativos; Factor C3 e C4 do complemento normais, serologias negativas (EBV, VHC, HIV, Herpes 1 e 2, Varicela zóster, parvovirus, CMV), destacando-se apenas anti-HBs e anti-HBc positivo com Ag-HBs negativa. Procedeu-se ainda a biopsias cutâneas que confirmou diagnóstico de vasculite leucocitoclástica. Instituiu-se corticoterapia sistémica, com franca melhoria das lesões cutâneas. Não se verificou recidiva hemorrágica.

A púrpura de Henoch-Schonelein, também designada por vasculite leucocitoclástica, é uma vasculite auto-imune não granulomatosa sistémica, que envolve os pequenos vasos. A etiologia não está esclarecida, mas associa-se a infecção, fármacos, vacinas, tumores e deficit de alfa-1-antitripsina. É a forma de vasculite mais frequente nas crianças, sendo menos frequente em adultos. O envolvimento cutâneo é a forma mais comum de apresentação e geralmente precede o gastrointestinal. A segunda porção do duodeno é a região mais afectada. Pode manifestar-se por náusea, vômitos ou hemorragia digestiva. Os achados endoscópicos incluem eritema, edema, petéquias e sufusões hemorrágicas. O diagnóstico histológico é confirmatório. Este caso ilustra o envolvimento gastrointestinal numa doente com vasculite leucocitoclástica.

Serviço de Gastreenterologia e Hepatologia - Centro Hospitalar Lisboa Norte