

42 APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE GASTROENTERITE EOSINOFÍLICA

Silva Fernandes J., Ramos R., Vicente C., Cabral V., Mascarenhas J., Casteleiro Alves C.

A gastroenterite eosinofílica (GE) é uma doença rara, caracterizada por sintomas gastro-intestinais (sendo a dor abdominal o mais comum) e pela infiltração eosinofílica do tracto GI sem outra causa que explique a eosinofilia. É comum a associação com atopia ou alergias alimentares.

As características clínicas da doença variam segundo a camada tecidual afectada (mucosa, muscular e/ou subserosa) e a extensão da doença. A ascite é o tipo de apresentação mais rara da gastroenterite eosinofílica e relaciona-se preferencialmente com a afectação da subserosa.

Apresentamos o caso de um homem de 52 anos com antecedentes de sarcoidose sob corticoterapia até há 2 meses, que recorre ao SU por febre, anorexia, dor abdominal e aumento marcado do perímetro abdominal, com sensivelmente 1 mês de evolução.

O estudo analítico revelou leucocitose de 33.500 com predomínio de eosinófilos (60.8%) e PCR negativa. Realizou paracentese evacuadora com saída de 4L de líquido hemático cuja análise revelou numerosos eosinófilos.

O estudo endoscópico alto e baixo não evidenciou alterações. Foram feitas biópsias de todo o trajecto visualizado, que mostraram um infiltrado inflamatório na lâmina própria, com alguns eosinófilos.

Tendo em conta a dúvida diagnóstica entre Sarcoidose peritoneal ou GE de afectação serosa, fez-se uma biópsia do peritoneu parietal por via laparoscópica que mostrou eosinofilia peritoneal, excluindo a presença de granulomas.

Actualmente o doente encontra-se assintomático após início da dieta de eliminação empírica, sem recurso a corticóides.

Centro Hospitalar Cova da Beira - Covilhã