

46 DESCONEXÃO NEURO-INTESTINAL

Silva Fernandes J. , Ramos R. , Vicente C. , Kassem A. , Mascarenhas J. , Cruto C., Rosado P., Ascensão M. , Casteleiro Alves C.

A pseudo-obstrução intestinal crónica (POIC) é um distúrbio raro, caracterizado pela ausência parcial/total de propulsão gastrointestinal, sendo obrigatório excluir uma obstrução mecânica.

Esta entidade pode ser idiopática ou secundária quando causada por conectivites, radioterapia, fármacos, infeções, neoplasias, entre outras. Destas, destaca-se o síndrome anti-Hu, que quase sempre surge num contexto paraneoplásico, e que é mediado por auto-anticorpos, que reagem contra proteínas neuronais.

Na POIC estes autoanticorpos atacam os plexos nervosos do trato digestivo, culminando em aganglionose secundária.

Apresentamos o caso de um homem de 52 anos, com um quadro de obstipação e vómitos pós-prandiais precoces com 1 semana de evolução. Foi descartada a hipótese de íleus mecânico por meio de laparotomia exploradora.

No laborioso estudo da POIC, a serologia revelou positividade para o anticorpo anti-neuronal, anti-HU.

Após tratamento colinérgico, imunomodulador e procinético houve controlo sintomático.

O quadro permanece sem etiologia definida, pelo que o rastreio de uma neoplasia subjacente permanece um imperativo, mesmo depois de décadas do início da clínica.

É um caso clínico verdadeiramente raro, de tratamento complexo, para o qual o Gastroenterologista deverá estar alerta.

Centro Hospitalar Cova da Beira (Hospital Pêro da Covilhã)