

189 ADENOCARCINOMA DO PULMÃO METASTIZADO AO CÓLON – SITUAÇÃO RARA COM ASPETO ENDOSCÓPICO SINGULAR

Palmela C., Barjas E., Sena P., Oliveira J., Costa Santos M., Picado B., Duarte S., Madureira R., Cravo M.

Os autores apresentam o caso de um homem de 71 anos, com antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e refluxo gastro-esofágico. Duas semanas antes do internamento inicia quadro caracterizado por tosse, febre, dispneia, sudorese noturna, anorexia e emagrecimento (5% do peso habitual) tendo iniciado antibioterapia por suspeita de infeção respiratória. Por persistência do quadro clínico realizou TC tórax em ambulatório que revelou a presença de tromboembolismo pulmonar e múltiplas adenopatias mediastínicas e abdominais. Neste contexto foi proposto internamento na nossa instituição para esclarecimento etiológico. Em internamento, realizou TC toraco-abdomino-pélvica que revelou espessamento parietal circunferencial segmentar do cólon transverso num extensão de 75mm, densificação espiculada da gordura mesentérica envolvente, extenso conglomerado adenopático mesentérico, retroperitoneal e mediastínico, e nódulo pulmonar de 21mm, com contornos espiculados, localizado na pirâmide basal esquerda. Realizou colonoscopia total observando-se, em todos os segmentos cólicos, múltiplas lesões com aspeto pseudo-polipóide, de cor violácea, com pregas a convergir para uma cicatriz central. No transverso proximal, observava-se uma lesão de maiores dimensões (50mm) ocupando 50% da circunferência (Vídeo). As biópsias revelaram fragmentos de adenocarcinoma (NOS) GII que dissociava fibras musculares sugestivo de eventual infiltração secundária. O estudo imunohistoquímico revelou positividade para CK7 e TTF1 e foi negativo para CK20. Estes achados foram sugestivos de metástase no cólon de adenocarcinoma com provável ponto de partida no pulmão. A metastização da neoplasia do pulmão para o trato gastrointestinal é rara. O cólon é das localizações menos frequente, estando descritos cerca de 13 casos na literatura. O aspeto endoscópico não é específico, estando descritas sobretudo lesões únicas que mimetizam neoplasia primária do cólon. Os autores salientam a raridade do caso, os aspetos endoscópicos e a multifocalidade das lesões ilustradas em vídeo.

Hospital Beatriz Ângelo, Loures