

CO-018 - THE SHORT INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE: VALIDAÇÃO DA VERSÃO PORTUGUESA NA SEQUÊNCIA DO ESTUDO SEXIDI

Joana Roseira¹; Helena Tavares De Sousa¹; Ana Marreiros²; Patrícia Queirós¹; Ana Margarida Vaz¹; Tânia Gago¹; Luís Contente¹; Horácio Guerreiro¹

1 - Centro Hospitalar do Algarve; 2 - Universidade do Algarve

Introdução e Objetivos

A qualidade de vida relacionada com a saúde (HRQoL) é uma medida importante da auto-perceção de doença. *The Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire* (SIBDQ) é um instrumento amplamente utilizado de HRQoL na Doença Inflamatória Intestinal (DII), tendo já sido estabelecida a sua correlação com vários índices de actividade da DII (Crohn's disease activity index, Walmsley and Harvey-Bradshaw Simple Index; Simple Clinical Colitis Activity Index). Neste trabalho pretende-se a validação da versão portuguesa do SIBDQ de acordo com a *Consensus-based Standards for the selection of the health Measurement Instruments* (COSMIN) checklist.

Material

Na sequência do estudo *SexIDI* foi construída tradução portuguesa do SIBDQ, o qual foi preenchido por doentes com DII em dois *timepoints* (0 e 2 semanas). Realizada análise de fidelidade (consistência interna, teste-reteste e coeficiente de correlação intraclasse) e validade [Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure e Bartlett's Test]. Aplicado ρ (rho)Teste para correlações lineares (Pearson Correlation).

Sumário dos Resultados

No *timepoint 0*, 92 doentes (38 doença de Crohn, 54 colite ulcerosa) completaram o SIBDQ. Após 2 semanas 33 doentes repetiram o questionário. Verificada boa consistência interna do instrumento (α Cronbach's=0,803). O coeficiente de correlação intraclasse foi 0,8 (IC 0,736 a 0,858) e 0,7 (IC 0,499 a 0,824) no teste-reteste. A análise factorial verificou 3 dimensões (emocional, sistémica e intestinal) com uma razão de KMO=0,582 e *p value* associado ao Bartlett's Test <0,05. No âmbito do estudo *SexIDI*, identificou-se ainda *cut-off*=54 no SIBDQ para diferenciar a auto-perceção de menor actividade da doença, a qual se correlacionou positivamente com a satisfação sexual (ρ =0,268; p <0,05) e negativamente com a incidência de depressão (ρ = -0,627; p <0,05).

Conclusões

A versão portuguesa do SIBDQ obtida apresenta fidelidade interna e externa, sendo, pois, válida e interpretável como medida de HRQoL para a população portuguesa de doentes com DII.