

EP-204 - TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DE SUBOCLUSÃO INTESTINAL POR LIPOMA GIGANTE

J. Fernandes¹; R. Ramos¹; C. Vicente¹; C. Casteleiro¹

1 - Serviço de Gastreenterologia - Centro Hospitalar da Cova da Beira

Descrição: Os lipomas gastrointestinais são neoplasias benignas, de crescimento lento, diagnosticadas quase sempre de forma incidental. No entanto em função do tamanho e localização podem chegar a dar sintomas como hemorragia, obstrução, invaginação ou prolapso.

Descrevemos o caso de um homem de 78 anos, com várias idas ao Serviço de Urgências por quadro de dor abdominal intermitente, com cerca de 8 meses de evolução e registo de um episódio de suboclusão intestinal nesse período.

Realizou colonoscopia na nossa Unidade de Endoscopia, em regime de ambulatório, que revelou uma lesão com cerca de 10 cm, de cor amarelada, aparentemente submucosa, que ocupava a totalidade do lúmen, e que era sugestiva de lipoma.

Procedeu-se à excisão da lesão supracitada, com recurso a ansa diatérmica, após aplicação de 3 endoloops. O procedimento decorreu sem complicações. O estudo histológico confirmou a suspeita de lipoma. O doente não voltou a apresentar episódios de dor abdominal (em seguimento há mais de 2 anos).

Motivação: Destacamos o caso pelo inusitado quadro clínico e pela resolução desta patologia sem necessidade de recorrer a cirurgia.