

IGE-005 - MIOTOMIA ENDOSCÓPICA PERORAL NO TRATAMENTO DA ACALÁSIA EM DOENTE COM MIOTOMIA DE HELLER PRÉVIA

Iala Pereira Costa¹; Joyce Chivia¹; Catarina Felix¹; José Rodrigues¹; Pedro Barreiro¹; Cristina Chagas¹

1 - Hospital Egas Moniz - CHLO

Doente de 48 anos, sexo feminino, com diagnóstico de acalásia há 8 anos, submetida à data a miotomia de Heller com boa resposta clínica inicial. Por recidiva dos sintomas de disfagia, de agravamento progressivo, a doente foi referenciada à nossa instituição. Clinicamente apresentava um score de Eckardt de 7 pontos. Repetiu manometria de alta resolução que confirmou o diagnóstico de acalásia tipo II (classificação de Chicago). A EDA identificou cardia encerrado, ultrapassando-se com pequeno ressalto. O estudo contrastado do esófago confirmou atraso no esvaziamento esofágico, sem dilatação esofágica significativa. Após discussão das hipóteses terapêuticas optou-se por realização de miotomia endoscópica peroral (POEM). O procedimento foi realizado no bloco operatório com apoio anestésico (EOT), realizando-se uma abordagem posterior com miotomia selectiva das fibras musculares circulares com recurso à Triangle Knife (Olympus). Destaca-se a presença de fibrose severa durante a realização do túnel na submucosa a nível do cardia e vertente gástrica associada ao procedimento prévio. O procedimento demorou 90 minutos, sem registo de complicações. Manteve-se internada por 48H com introdução da dieta oral às 24H sem intercorrências. A doente apresenta actualmente 10 meses de seguimento encontrava-se assintomática (score de Eckardt 0) e sem evidência clínica ou endoscópica de doença de refluxo gastro-esofágico.

A técnica POEM foi descrita recentemente para o tratamento da acalásia revelando-se uma opção terapêutica eficaz (taxas de sucesso clínico > 90%). Ainda que tecnicamente possa ser mais difícil e demorado em doentes com miotomia cirúrgica prévia, a aplicação da técnica nestes casos tem apresentado resultados de eficácia e segurança globalmente sobreponíveis quando comparados com doentes naïves. Descreve-se a técnica de POEM demonstrando-se ser uma opção terapêutica em doentes com recidiva/falência pós miotomia de Heller destacando-se as particularidades nestes casos: necessidade de abordagem posterior; demonstração de fibrose durante túnel da submucosa. Apresenta-se vídeo e iconografia