

IGE-011 - RE-POEM: UMA OPÇÃO VÁLIDA APÓS FALÊNCIA PRIMÁRIA DA TÉCNICA?

Pedro Barreiro¹; Iala Carina¹; Catarina Vieira²; José Pedro Rodrigues¹; Catarina Felix¹; Joyce Chivia¹; Cristina Chagas¹
1 - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2 - Centro Hospitalar Barreiro Montijo

Mulher, 55 anos, realizou EDA por disfagia identificando-se esófago tortuoso e dilatado (6 cm) associado a cardia encerrado. Posterior manometria de alta resolução confirmaram o diagnóstico de acalásia tipo II. A doente foi submetida a dilatações endoscópicas pneumáticas com recidiva precoce dos sintomas (score de Eckardt 7). Neste contexto optou-se por realização de peroral endoscopic myotomy (POEM). O procedimento foi realizado com recurso à nova Triangle Tip Knife J (Olympus), optando-se por realizar uma abordagem anterior: túnel na submucosa a 10 cm da transição esófago-gástrica (TEG) prolongando-se por 3-4cm no estômago com miotomia desde os 7 cm da TEG até 3 cm na vertente gástrica por técnica de parcial full-myotomy. O procedimento decorreu sem complicações. Registou-se uma resposta clínica insatisfatória (Score de Eckardt 5). Posterior estudo contrastado do esófago e EDA identificaram imeditamente a montante do cardia ligeira angulação com criação de "pseudo-bolsa" na vertente posterior do esófago que poderia justificar a persistência dos sintomas. Após discussão das opções terapêuticas com a doente foi proposta para novo POEM. O procedimento foi tecnicamente similar ao descrito mas com abordagem posterior. Não se registaram complicações, alcançando-se boa resposta clínica (score de Eckardt 1).

O POEM é actualmente aceite na terapêutica da acalásia (elevado sucesso clínico >90% associado a baixa taxa de complicações). Contudo uma pequena percentagem de doentes irá persistir ou recorrer dos sintomas prévios ao procedimento. Nestes casos, a literatura ainda é escassa para definição da melhor opção terapêutica. Pequenas séries, sugerem que novo POEM (Re-POEM) poderá ser uma opção com taxas de sucesso > 85%. Do conhecimento dos autores este é o primeiro caso de Re-POEM em Portugal, descrevendo-se igualmente a técnica com a nova Triangle Tip Knife J, técnica de parcial full myotomy e diferenças técnicas entre abordagem anterior e posterior. Apresentam-se vídeos e iconografia.