EP-187 - DISSECÇÃO DA SUBMUCOSA DE LESÕES DO CÓLON – CÓLON ASCENDENTE E SIGMÓIDE

Carolina Chálim Rebelo¹; Nuno Nunes¹; Margarida Flor De Lima¹; José Renato Pereira¹; Vera Costa Santos¹; Ana Catarina Rego¹; Nuno Paz¹; Maria Antónia Duarte¹

1 - Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPE

Descrevem-se dois casos de dissecção da submucosa de lesões localizadas em dois segmentos distintos do cólon, um no cólon ascendente proximal e o segundo na sigmóide.

O primeiro caso diz respeito a um doente do sexo masculino, com 64 anos, com lesão polipóide sésil Paris Is de 25mm no cólon ascendente, detetado em exame de rastreio de cancro do cólon. O segundo caso refere-se a uma doente do sexo feminino, de 64 anos, com lesão polipóide sésil Paris Is, com cerca de 70mm de diâmetro, localizada a 40 cm da margem anal.

Em ambos os casos foi utilizada a fonte de eletrocirurgia ERBE VIO® 3 e faca hybrid-knife T. Iniciados os procedimentos com a injeção de solução de glicerol com índigo de carmino e adrenalina. Realizou-se incisão da mucosa com hybrid-knife, utilizando-se corrente dry-cut efeito 4 e dissecção da submucosa, com corrente swift coagulation efeito 3, com excisão total das lesões no final do procedimento.

istologicamente, no primeiro caso tratava-se de um adenoma tubular com displasia de alto grau, e no segundo de pólipos adenomatosos, com displasia de baixo grau. Foram ambos excisados com margens verticais e laterais livres (R0).

A dissecção da submucosa permite a ressecção eficaz de lesões neoplásicas de grandes dimensões, evitando o recurso à cirurgia. Neste caso, evidenciou-se o sucesso técnico na abordagem terapêutica de lesões do cólon, inclusivamente à direita por dissecção da submucosa.