

EP-208 - ENDOMETRIOSE ASSOCIADA A DOENÇA DE CROHN - A PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Fernando Azevedo<sup>1</sup>; Ana Ruivo<sup>1</sup>; Rodrigo Nemésio<sup>1</sup>; António Manso<sup>1</sup>; Hélder Carvalho<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

A endometriose é uma patologia na qual ocorre proliferação de células endometriais em locais extra-uterinos. A região íleo-cecal é afectada em cerca de 1-7 % dos casos. Dada a sintomatologia inespecífica e variada desta patologia, é difícil o seu diagnóstico diferencial, nomeadamente com a doença de Crohn e particularmente no íleon terminal. A opção cirúrgica deve ser considerada nestes casos.

1º caso: Doente do sexo feminino com 30 anos, com diagnóstico de doença de Crohn do íleon terminal desde há 5 anos, sob terapêutica imunossupressora. Recorre ao SU por vômitos e dor abdominal. Efectuou TC abdominal que revelou estenose do íleon terminal e pneumoperitoneu por perfuração do colón sigmóide. Foi submetida a ressecção íleo-cecal e ressecção segmentar do sigmóide. Estudo histológico revelou endometriose.

2º caso: Doente de 32 anos, do sexo feminino, com seguimento em Gastrenterologia por suspeita de doença celíaca. Queixas esporádicas de dor na região pélvica. Trazida ao SU por vômitos e dor abdominal com 5 dias de evolução. Clinicamente apresentava emagrecimento marcado (IMC 16) e distensão abdominal. Efectuou TC abdominal que revelou distensão do delgado e estenose do íleon terminal. Foi internada para tratamento médico. Realizou colonoscopia total, tendo as biópsias sido inconclusivas, e uma entero-RM que mostrou espessamento do íleon terminal. Foi posteriormente submetida a ressecção íleo-cecal e ressecção em cunha do sigmóide por fístula íleo-sigmoideia detectada per-operatoriamente. Exame histológico revelou ileíte crónica terminal secundária a doença de Crohn com endometriose.

Os dois casos apresentados mostram uma associação rara entre doença de Crohn e endometriose. A distinção entre as duas patologias é difícil, e deve ser equacionada nas mulheres. Novos estudos associam a endometriose como um factor de risco que promove o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, em particular a doença de Crohn.