

EP-233 - INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA POR INFILTRAÇÃO NEOPLÁSICA EM DOENTE ALCOÓLICO

Ana Catarina Carvalho¹; Francisco Pires¹; Ricardo Cardoso¹; Paula Sousa¹; Juliana Pinho¹; Diana Martins¹; Ricardo Araújo¹; Eugénia Cancela¹; António Castanheira¹; Paula Ministro¹; Américo Silva¹

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Caso clínico: Homem de 55 anos com antecedentes de alcoolismo crónico (150 g/dia) e tabagismo (carga 40 UMA), que, após ter sido medicado com múltiplos analgésicos por queixas recentes de lombalgia aguda, iniciou quadro súbito de dor no hipocôndrio direito, icterícia, colúria e anorexia. Na observação inicial, encontrava-se icterico, sem encefalopatia e com hepatomegalia dolorosa cerca de 4 cm abaixo do rebordo costal. Analiticamente com hepatite com padrão colestático, trombocitopenia 34.000, sem coagulopatia, hiperbilirrubinemia 6 mg/dL à custa da direta, e LDH 3987 UI/L. Ecografia com hepatomegalia heterogênea com padrão micronodular.

Internado para estudo complementar, colocando-se como hipóteses diagnósticas mais prováveis hepatite alcoólica aguda, hepatite infecciosa aguda, doença linfoproliferativa e hepatite tóxica.

Do estudo realizado destaca-se serologias vírias negativas; TAC com hepatomegalia com contornos irregulares (cirrose vs. hepatite), sem esplenomegalia.

Durante o internamento, o doente apresentou rápido agravamento do estado clínico, com evidência de insuficiência hepática aguda (encefalopatia e coagulopatia de novo). Analiticamente evoluiu com reação leucemóide e displasia da linha granulocítica. Realizada biopsia hepática transjugular, verificando-se, porém, deterioração rápida do estado geral, associado a disfunção multiorgânica e morte.

O resultado da biopsia hepática foi conhecido posteriormente, revelando envolvimento hepático metastático por neoplasia neuroendócrina de pequenas células, com Ki-67 de 90%, de provável origem pulmonar.

Conclusão: A metastização hepática maciça é uma causa infrequente de falência hepática aguda, embora deva ser considerada no contexto adequado após exclusão das causas mais frequentes.