

132 PAPEL DA TERAPÊUTICA ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR DO CÓLON

Atalaia Martins C., Marcos P., Barbeiro S., Silva F., Canhoto M., Eliseu L., Gonçalves C., Cotrim I., Vasconcelos H.

Introdução - A terapêutica endoscópica na hemorragia diverticular do cólon (HDC) tem como objetivos cessar a hemorragia ativa, reduzir o risco de recidiva, diminuir as necessidades transfusionais e evitar a cirurgia. Contudo, para efetuar uma terapêutica dirigida é necessária a identificação da lesão, o que nem sempre é possível. **Objetivo** – Análise dos *outcomes* da terapêutica endoscópica nos doentes com HDC num período de 10 anos. **Material e métodos** – Estudo retrospectivo dos doentes que fizeram terapêutica endoscópica no contexto de HDC entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2014. Recolha de dados através da consulta dos processos clínicos e o seu tratamento no *Microsoft Excel*®2013. **Resultados** – Existiram 156 internamentos por HDC e em 15,4% foi identificado o divertículo que constituía sede da hemorragia, tendo sido tentada terapêutica endoscópica em todos eles. A média de idades nestes doentes foi de $78,4 \pm 7,3$ anos e 79,1% eram homens. Foram utilizadas várias técnicas hemostáticas: em 54,2% foi realizada de forma combinada a injeção de adrenalina e aplicação de hemoclips, em 20,8% apenas hemoclips, em 16,7% apenas adrenalina e em 8,3% coagulação por argon plasma. A falência terapêutica foi de 12,5% apresentando estes doentes recidivas hemorrágicas nas primeiras 72 horas. As técnicas hemostáticas utilizadas nestes doentes foram: em 33,3% hemoclips, em 33,3% adrenalina e em 33,3% a combinação dos dois anteriores. Nas recidivas hemorrágicas foi realizada nova tentativa de hemostase que foi bem sucedida em 66,7%. Contudo, 33,3% (n=1) teve necessidade de terapêutica cirúrgica urgente. **Conclusão** – A terapêutica endoscópica na HDC é segura e tem uma elevada taxa de sucesso. A escolha da técnica endoscópica não pareceu ter influência no sucesso da terapêutica. Ressalva-se a dimensão pequena da amostra que é inerente a uma situação clínica pouco frequente.

Centro Hospitalar de Leiria