CO-057 - FATORES DE RISCO E MODELO PREDITIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFECÇÕES POR BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES E IMPACTO NO PROGNÓSTICO EM DOENTES INTERNADOS POR CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA

Rui Morais¹; Susana Rodrigues²; Marco Silva¹; Armando Peixoto¹; Edgar Moniz³; Ana Santos¹; Inês Pita⁴; Rodrigo Liberal¹; Rui Gaspar¹; Eduardo Rodrigues-Pinto¹; Hélder Cardoso¹; Guilherme Macedo¹

1 - Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar São João; 2 - Universidade de Berna; 3 - Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar São João; 4 - Serviço de Gastrenterologia, IPO Porto

Introdução e objetivos

As infeções bacterianas são a principal causa de mortalidade nos doentes com cirrose hepática descompensada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de infeções por bactérias multirresistentes, fatores de risco associados e o seu impacto no prognóstico.

Material

Estudo retrospectivo que avaliou doentes internados no Serviço de Gastrenterologia entre 2009 e 2016 por cirrose hepática descompensada que desenvolveram infeções bacterianas com isolamento microbiológico confirmado.

Sumário dos Resultados

Identificámos 308 infeções com isolamento microbiológico confirmado, correspondendo a 218 internamentos, num total de 161 doentes. A idade mediana dos doentes foi 63 anos (55-71), sendo 67% homens. A doença hepática alcoólica foi a principal causa de cirrose (72%). Das infeções avaliadas, 87% eram nosocomiais e 13% adquiridas na comunidade. A infeção mais comum foi a do trato urinário (57%). Em 27% dos doentes verificaram-se pelo menos duas infeções bacterianas concomitantes. Foram isoladas bactérias multirresistentes em 51% dos doentes. Profilaxia para peritonite bacteriana espontânea (OR 2,3; p=0,009), Meld superior a 19 à admissão (OR 1,7; p=0,043), internamento em Cuidados Intensivos/Intermédios no mês prévio (OR 2,8; p=0,001) e antibioterapia por infeção nos 6 meses prévios (OR 2,4; p=0,001) associaram-se de forma independente à ocorrência de infeção multirresistente na regressão logística múltipla. Um modelo para prever a ocorrência de infeção multirresistente foi criado a partir das variáveis identificadas, que apresentou uma área sob a curva ROC de 0,723 (IC95% [0,667-0,780]), uma sensibilidade de 66% e especificidade de 72%. Na regressão linear a ocorrência de uma infeção multirresistente associou-se independentemente a uma maior duração do internamento (OR 2,646; p=0,009). Não se verificou uma associação independente entre infeção multirresistente e mortalidade no internamento (p=0,695).

Conclusões

A prevalência de infeções multirresistentes em cirróticos é significativa, estando associada a um internamento hospitalar mais prolongado. É possível identificar fatores preditivos da sua ocorrência para futuramente implementar estratégias epidemiológicas de forma a reduzir o risco destas infeções.