



**Semana
Digestiva**
Digital 20 e 21 de
novembro
2020

Performance endoscópica no estudo de diarreia crónica e mucosa cólica normal

Linhares M., Ramos D., Pestana I., Pereira F., Pinto JD, Caldeira A., Tristan J.;
Pereira E., Sousa R., Banhudo A. Serviço de Gastroenterologia – ULS Castelo Branco

INTRODUÇÃO

A colonoscopia está indicada no estudo da diarreia crónica. Na presença de uma mucosa cólica normal está recomendado realizar ileoscopia e biópsias aleatórias da mucosa cólica, com o objetivo de avaliação de doença inflamatória intestinal e colite microscópica.

OBJETIVO: avaliar a performance endoscópica no estudo de diarreia crónica em doentes com mucosa cólica normal.

MATERIAL/MÉTODOS

Estudo retrospectivo entre 2013 e 2019

Inclusão colonoscopias totais (com ou sem ileoscopia) realizadas por diarreia crónica de novo e não sanguinolenta

Avaliada a taxa de realização de ileoscopia e de biópsias, e da localização e armazenamento destas.

Analizada a evolução temporal no serviço.

RESULTADOS

N = 174 colonoscopias totais
62,1% mulheres, idade média 59,7 ± 18 anos

Ileoscopia (n=53)

30,5%

36 íleon normal

25%
biópsias

Biópsias cólicas aleatórias (n=107)


61,5%

Performance biópsias:

91,5% (n=97) biópsias em todos os segmentos
(44 - 2 frascos; 24 - 4 frascos; 19 - outros)

8,41% (n=9) sem biópsias do colón ascendente

17,76% (n=19) incluíram biópsias do reto



CONCLUSÕES

Verificou-se uma reduzida taxa de realização de ileoscopia e biópsias para estudo de doença inflamatória intestinal e colite microscópica, respetivamente

Pretende-se relembrar que a ileoscopia com biópsia pode aumentar o rendimento diagnóstico em 15-20 % (1) e que a colite microscópica é uma importante causa de diarreia

REFERÊNCIAS

(1) Arasaradnam RP, Brown S, Forbes A, et al. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition. Gut 2018;67:1380–1399.