

9 TRATAMENTO DE LESÃO GÁSTRICA POR TÉCNICA DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA SUBMUCOSA EM DOENTE COM HIPERTENSÃO PORTAL.

Rodrigues J., Barreiro P., Carvalho L., Túlio M., Costa P., Chagas C.

A disseção endoscópica da submucosa (DES) é uma técnica segura e eficaz para o tratamento de lesões gástricas pré-malignas e malignas precoces na população em geral. Apesar de um risco aumentado de hemorragia, trabalhos recentes têm demonstrado segurança e eficácia na aplicação da técnica em doentes com hipertensão portal, principalmente quando comparada com a alternativa cirúrgica, que se associa a uma morbilidade e mortalidade acrescida.

Caso Clínico: Doente de 66 anos, melanodérmica, com doença hepática crónica (child-pugh B), realiza endoscopia digestiva alta em contexto de anemia microcítica onde se identificam varizes esofágicas pequenas e, a nível do antro gástrico, lesão polipóide séssil (T0-Is) com cerca de 30 mm de maior eixo cujas biopsias foram compatíveis com adenocarcinoma intramucoso. O estadiamento com TC toraco-abdomino-pélvica não revelou adenopatias loco-regionais ou lesões à distância. Neste contexto e após avaliação multidisciplinar a doente foi submetida a excisão endoscópica da lesão, em bloco, por técnica de DES, com recurso às facas Dual Knife e It Knife 2 (Olympus). O procedimento foi realizado no bloco operatório, sob sedação profunda com EOT e com duração de 65 minutos. Não foram registadas complicações precoces ou tardias, nomeadamente hemorragia digestiva clinicamente relevante. A avaliação anátomo-patológica da peça foi compatível com lesão com displasia de alto grau (pTis), totalmente excisada (R0). Apresenta actualmente 5 meses de seguimento sem evidência de recidiva tumoral.

Apresenta-se iconografia e vídeo do procedimento.

Serviço de Gastrenterologia, Hospital de Egas Moniz, CHLO, Lisboa.