

130 MUCOSECTOMIA ENDOSCÓPICA DO CÓLON E DO RECTO – ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA TERAPÊUTICA.

Russo P., Capela T., Carvalho D., Costa M., Pinto A., Coimbra J.

Introdução: A mucosectomia endoscópica permite a excisão de lesões coloreticais sésseis e planas de grandes dimensões. Devido ao menor risco de perfuração e exequibilidade técnica, os pólipos do recto são habitualmente considerados de mais fácil excisão.

Objectivo: Comparar a eficácia e a segurança da mucosectomia endoscópica em piecemeal do recto em relação aos restantes segmentos cólicos.

Métodos: Seleccionados os doentes submetidos a mucosectomia em piecemeal entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2014 no nosso centro. Apuradas as características demográficas dos doentes, características dos pólipos (tamanho, localização, tipo de pólipo – classificação de Paris, histologia), técnica utilizada, segurança e eficácia do procedimento.

Resultados: 46 doentes (29 homens) com idade média de 71,8 anos; 26 mucosectomias do recto com sucesso técnico de 96,2% (25/26), e 20 mucosectomias do restante cólon com sucesso técnico em todos os casos. Registada uma perfuração numa mucosectomia do cego. Não se registaram outras complicações. O tamanho médio das lesões do recto foi de 34,8 mm (5 lesões > 40 mm) e o tamanho médio das lesões do restante cólon foi de 31,7 mm (3 lesões > 40 mm).

Foram identificados 5 adenocarcinomas do recto (2 doentes aguardam cirurgia, dois mantiveram vigilância endoscópica sem recidiva, um doente foi operado, sem recidiva na peça operatória) e 4 adenocarcinomas do restante cólon (4 operados, um dos quais sem recidiva na peça operatória).

Sucesso endoscópico de 19/26 (73%) nas lesões do recto (até 3 procedimentos) e 17/20 (85%) no restante cólon (até 2 procedimentos), não se tendo observado diferença estatisticamente significativa ($p=0,4762$).

Conclusões: A mucosectomia endoscópica é um procedimento seguro e eficaz na excisão de lesões coloreticais, não se tendo verificado diferenças estatisticamente significativas de eficácia na excisão das lesões do recto em relação ao restante cólon. Sugestão de carácter menos agressivo do adenocarcinoma do recto.

Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar de Lisboa Central