

140 O SCORE CLIF-SOFA É O MELHOR PREDITOR DA MORTALIDADE A CURTO PRAZO EM DOENTES INTERNADOS POR CIRROSE DESCOMPENSADA

Perdigoto D., Cardoso R., Figueiredo P., Sofia C.

Introdução:

A falência hepática crónica agudizada (FHCA) é um conceito recente que tem sido cada vez mais aplicado. Nesse contexto, o estudo multi-cêntrico CANONIC integrou um novo score, o CLIF-SOFA, que constitui uma adaptação para doentes com cirrose do score SOFA utilizado em doentes críticos. O score CLIF-

SOFA incorpora 6 categorias: falência hepática, renal, cerebral, coagulação, circulatória e respiratória.

Objetivos: determinação da capacidade prognóstica do score CLIF-

SOFA para prever a mortalidade a breve prazo (28 dias) de doentes internados na enfermaria ou em cuidados intensivos por descompensação de cirrose, com ou sem falência hepática crónica agudizada. Métodos:

estudo prospetivo, com duração de 6 meses, que incluiu doentes admitidos por descompensação de cirrose devido a infeção, ascite, encefalopatia, hemorragia digestiva ou lesão de órgão. Os scores Child, MELD, MELD-Na e CLIF-

SOFA foram calculados na admissão e confrontados com a mortalidade dos doentes ao fim de 28 dias.

Resultados: incluídos 65 episódios de doentes: 14 mulheres (21.5%) e 51 homens (78.5%). Idades de 36 a 84 anos, média de 59 ± 12 anos. MELD médio de 22 ± 7 . O valor do score CLIF-

SOFA variou entre 1 a 16 com média de 7 ± 3 ; 25 doentes (38.5%) apresentaram critérios de FHCA. A área debaixo das curvas ROC para os scores Child, MELD, MELD-Na e CLIF-

SOFA foi respectivamente: 0.70, 0.75, 0.78 e 0.83.

Conclusões: o score CLIF-

SOFA, sendo um score amplo e avaliando vários parâmetros do estado mórbido do doente cirrótico, integra as várias componentes de falência de órgão. Pode assim tornar-

se no score mais fiável nos casos agudos. Permite determinar com melhor eficácia a mortalidade a breve e prazo. Pode, por essa razão, ser muito útil na tomada de decisões clínicas como o internamento de doentes em unidades de cuidados intensivos ou da opção por terapêuticas agressivas precocemente.

Serviço de Gastroenterologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra