

246 CARACTERIZAÇÃO DE DOENTES COM COLANGIOCARCINOMA REFERENCIADOS PARA CPRE PARA DRENAGEM BILIAR

Rodrigues-Pinto E., Pereira P., Ribeiro A., Moutinho-Ribeiro P., Sarmento J.A., Vilas-Boas F., Santos-Antunes J., Macedo G.

Introdução: A drenagem biliar endoscópica com colocação de prótese biliar é o tratamento paliativo de escolha da obstrução biliar maligna condicionada por colangiocarcinoma. Não existe um consenso claro relativo à prótese ideal, método de colocação e técnica de re-intervenção. **Objectivo:** Caracterizar os doentes com colangiocarcinoma que realizaram drenagem biliar. **Métodos:** Estudo transversal de doentes com colangiocarcinoma referenciados para colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) para drenagem biliar, num centro de referencia, durante um período de 3 anos. **Resultados:** Trinta doentes colocaram próteses biliares por CPRE. A idade mediana na altura da CPRE foi 62 anos (36 – 88). O follow-up mediano foram 119 dias (IQR: 68 – 189). A taxa de mortalidade ao 3º mês foi 25% e ao 6º mês foi 64%. A intenção da prótese foi paliativa em 33% dos doentes, para início de quimioterapia paliativa em 63% e drenagem prévia a cirurgia em 4%. Treze por cento dos doentes realizaram radioterapia. A obstrução localizava-se na via biliar principal (VBP) distal em 30% dos doentes, na VBP média em 10%, na VB proximal em 13% e na placa hilar em 47%. Vinte por cento dos doentes realizaram dilatação antes da colocação da prótese. Foram colocadas próteses plásticas em 63% dos doentes, sendo rectas em 84% dos doentes. Cinquenta e oito por cento das próteses plásticas tinham comprimento superior a 7cm. Dos 11 doentes que colocaram próteses metálicas, 54% tinham comprimento superior a 80mm. O valor mediano de bilirrubina total antes da CPRE foi 16.4mg/dL (IQR: 6.8 – 21.5), sendo a variação de bilirrubina após CPRE 9.6mg/dL (IQR: 1.9 – 16.7). Quarenta por cento dos doentes repetiram CPRE por disfunção da prótese. **Conclusão:** O colangiocarcinoma condiciona um mau prognóstico em termos de sobrevida e qualidade de vida. A CPRE permite a drenagem biliar, palição e instituição posterior de quimioterapia.

Serviço Gastrenterologia, Centro Hospitalar São João