

296 VALOR DA COLONOSCOPIA EM DOENTES COM METÁSTASES DE TUMOR PRIMÁRIO DESCONHECIDO

Silva J. Fernandes S., Ribeiro I., Ponte A., Rodrigues J., Carvalho J.

INTRODUÇÃO: A pesquisa de tumor primário em doentes com metástases é uma indicação frequente de colonoscopia, mas o seu benefício não está esclarecido.

OBJETIVOS: Determinar a frequência de CCR nas colonoscopias totais realizadas para pesquisa de tumor primário, em doentes com metástases.

MÉTODOS: Estudo retrospectivo: avaliados todos os doentes que realizaram colonoscopia total para pesquisa de tumor primário no hospital entre janeiro/2010 e dezembro/2014. Critérios de exclusão: CCR prévio, lesão colorretal sugerida por imagem e massa retal palpável. A análise foi feita em SPSS®.

RESULTADOS: Dos doentes analisados, 62 preencheram os critérios de inclusão, 45.2% homens e 54.8% mulheres, com idade média de 65 anos. Os locais mais frequentes de metastização foram: fígado (n=25), pulmão (n=9) e SNC (n=9). Na amostra em estudo, apenas 3 doentes (4.8%) apresentaram neoplasia colo-retal: caso 1- mulher de 66 anos, com neoplasia do cólon sigmóide, submetida a cirurgia e quimioterapia paliativa, falecida 2 anos após o diagnóstico; caso 2- homem de 55 anos, neoplasia do ângulo esplénico, falecido 2 meses após o diagnóstico; caso 3- mulher de 76 anos, neoplasia do cólon ascendente, submetida a cirurgia, encontrando-se há cerca de 2 meses sob quimioterapia paliativa.

CONCLUSÃO: No nosso centro, a neoplasia do cólon foi um diagnóstico pouco frequente (<5%) nos doentes com metástases de tumor primário desconhecido, pelo que a colonoscopia não deverá ser considerado um exame de primeira linha neste grupo de doentes.

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia