CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E PATOLÓGICA DOS LINFOMAS DO CÓLON: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE REFERENCIAÇÃO AO LONGO DE 10 ANOS

Dias E¹, Marques M¹, Fonseca E², Macedo G¹

1 – Serviço de Gastreenterologia, Centro Hospitalar de São João
2 – Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar de São João

INTRODUÇÃO

Os linfomas correspondem a apenas 0.2-1.2% de todas as neoplasias do cólon. A apresentação clínica é inespecífica, sendo os sintomas mais comuns dor abdominal, perda de peso e diarreia. Além disso, os achados endoscópicos muito variáveis, podendo apresentar-se como mucosa de aspeto infiltrativo, ulceração, pólipos, massas ou até mesmo mucosa de aspeto normal. No entanto, associam-se tipicamente a mau prognóstico. Assim, torna-se importante um elevado índice de suspeição diagnóstica, de modo a possibilitar um diagnóstico precoce e instituição de terapêutica adequada. [1]

MATERIAL/MÉTODOS

Análise retrospectiva de todos os doentes com diagnóstico histológico de linfoma do cólon no Centro Hospitalar de São João entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2019.

RESULTADOS

- Foram identificados 31 doentes, com idade mediana de 69 anos, dos quais 16 (52%) do género feminino. As suas principais características resumem-se na Tabela 1.
- Os subtipos histológicos mais frequentes foram o linfoma B-difuso de grandes células (32.3%) e o linfoma do manto (25.8%), seguidos por linfoma MALT (9.7%), linfoma folicular (9.7%), linfoma de Burkitt (9.7%), linfoma linfocítico (6.5%) e linfoma T periférico (6.5%).
- Os sintomas mais frequentes foram dor abdominal (35.4%), sintomas constitucionais (25.8%), diarreia (22.5%) e retorragia (16.1%), enquanto 12 doentes (38.7%) se encontravam assintomáticos. Em 11 (35.4%) a doença teve uma apresentação aguda, sob a forma de oclusão intestinal ou quadros de abdómen agudo como apendicite ou diverticulite aguda.
- Foi realizada colonoscopia em 27 doentes, tendo sido identificadas alterações endoscópicas em todos, sob a forma de pólipos (33%), massa isolada (33%), infiltração difusa (22%) ou ulceração (11%), conforme ilustrado na Figura 1. Os segmentos mais frequentemente envolvidos foram cego e cólon ascendente.
- Foi realizado estudo complementar do restante tubo digestivo com endoscopia alta em 11 doentes, dos quais 3 apresentaram evidência de envolvimento por linfoma, e por videoenteroscopia por cápsula em 1 doente, onde o intestino delgado se encontrava envolvido sob a forma de múltiplos pólipos.
- A maioria (74.2%) encontrava-se em estadio IV. Fizeram tratamento 25 doentes, sob a forma de quimioterapia, verificando-se resposta completa em 48%, resposta parcial em 20% e ausência de resposta em 32%. Em 9 doentes, houve necessidade adicional de cirurgia.
- Durante o follow-up, verificou-se a morte de 14 doentes, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 45.1%. Dos fatores analisados, são preditores de mortalidade a presença de anemia (p=0.009), leucitose (p=0.035), DHL elevada (p=0.007), idade avançada (p=0.046) e ausência de resposta completa ao tratamento (p<0.001). Não foi encontrada nenhuma associação com género, subtipo histológico, estadio, localização, albumina ou manifestações clínicas.

Características	N=31 (%)	Subtipo histológico	
Idade		Linfoma B-difuso grandes células 10 (32.3)	
Mediana (anos)	68.5	Linfoma do manto	8 (25.8)
Âmbito (anos)	37-91	Linfoma MALT	3 (9.7)
Género		Linfoma folicular	3 (9.7)
Masculino	15 (48%)	Linfoma de Burkitt	3 (9.7)
Feminino	16 (52%)	Linfoma linfocítico	2 (6.5)
Manifestações clínicas		Linfoma T periférico	2 (6.5)
Dor abdominal	11 (35.4)	Localização	
Diarreia	8 (25.8)	Cego	5 (16.1)
Sintomas constitucionais	8 (25.8)	Cólon ascendente	3 (9.7)
Perda de peso	5 (16.1)	Cólon transverso	4 (12.9)
Retorragias	5 (16.1)	Cólon descendente	1 (3.2)
Tumefacção abdominal	3 (9.7)	Cólon sigmóide	2 (6.5)
Obstipação	2 (6.5)	Recto	4 (12.9)
Assintomático	12 (38.7)	Apêndice	2 (6.5)
Classificação		Múltiplos segmentos	10 (32.3)
Primário	8 (25.8)	Achados endoscópicos N=27	
Secundário	23 (74.2)	Pólipos	9 (33.3)
		Massa isolada	9 (33.3)
		Infiltração difusa	6 (22.2)
		Ulceração	3 (11.1)

Tabela 1 Características clínicas e patológicas da amostra

Figura 1 Os linfomas do cólon podem ter uma grande diversidade de aspectos endoscópicos podendo apresentar-se como: A) massas a simular adenocarcinoma B) Pólipos isolados C) Múltiplos pólipos D) Mucosa de aspecto infiltrativo

CONCLUSÕES

O linfoma do cólon é uma patologia rara e com elevada taxa de mortalidade. Tem apresentações clínica e endoscópica variáveis e identificam-se alguns fatores preditores de mau prognóstico como a idade avançada, a presença de anemia, leucitose e DHL elevada e a ausência de resposta completa ao tratamento.

REFERÊNCIAS

[1] Martín-Domínguez V, Mendoza J, Díaz-Ménendez A, Adrados M, Moreno-Monteaquedo JÁ, Santander C. Colon lymphomas: an analysis of our experience over the last 23 years. Rev Esp Enferm Dig 2018;110(12):762-767.